



令和元年度版



予防接種の予定



《お問い合わせ》

新冠町役場 保健福祉課 保健福祉グループ

健康推進係 保健師



TEL: 0146-47-2113

□ 予防接種って？

赤ちゃんや子どもは、大人のように、病気に対する抵抗力が完全にできあがっていません。そのため感染症にかかると、大人では考えられないような重い症状になることがあります。

赤ちゃんや子どもが、病気にかからないために行うのが予防接種です。


□ 予防接種を受ける前に知っておきたいこと


- 

① 前日は、入浴させ、身体を清潔にしておきましょう！
- 


② 接種日の朝は、子どもの状態をよく観察し、体調に変化がないか確認しましょう！
- 

③ 体調が悪いかな？と思ったら、次の機会に受けるようにしましょう！
- 

④ 受ける予防接種の必要性や効果、副反応を確認してから行きましょう。母子手帳交付時にお渡ししている『予防接種と子どもの健康』という冊子をお読みください。
- 

⑤ 当日持参する予診票は、お子さまの大切な資料となります。しっかりと記入して持参しましょう。
- 

⑥ 母子手帳は予防接種の大事な記録張でもあります。当日は忘れず持参しましょう。



定期の予防接種スケジュール

※定期接種：法律によって種類と接種対象が定められているもの（無料）



集団接種

新冠町保健センターで接種をします。（保護者あてに案内をお送りします）

予防接種の種類	対象となる年齢	日 程	
BCG	生後3ヶ月から 生後1歳未満	R1 年5月14日（火）	7月9日（火）
		9月10日（火）	11月12日（火）
		R2 年1月14日（火）	3月10日（火）
二種混合 （ジフテリア・破傷風）	小学校6年生	10月2日（水）	10月16日（水）

※ 日程は変更される場合がありますので、**個別通知・広報**を確認してください。



個別接種

裏面記載の医療機関にて個別に接種をします。

予防接種の種類	対象者	標準的な接種期間	回数	間隔
Hib (インフルエンザ菌 b 型)	2 ヶ月～5 歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が 2 ヶ月～7 ヶ月の場合 初回:3 回 追加:1 回	27～56 日 (4～8 週) ※1 初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて
～接種開始時期によって接種回数が違います～ ②初回接種開始時が 7 ヶ月～12 ヶ月の場合 初回:2 回を 27～56 日 (4～8 週) 間隔で ※2 追加:1 回を初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて ③初回接種開始時が 1 歳～5 歳未満の場合 1 回 ※1: 初回の 2・3 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて 1 回行う。 ※2: 初回接種の 2 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて 1 回行う。				
小児用肺炎球菌	2 ヶ月～5 歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が 2 ヶ月～7 ヶ月の場合 初回:3 回 追加:1 回	27 日以上 (4 週以上) ※3 初回接種終了後 60 日以上あけて (標準として 12～15 ヶ月齢時)
～接種開始時期によって接種回数が違います～ ②初回接種開始時が 7 ヶ月～12 ヶ月の場合 初回:2 回を 27 日以上 (4 週以上) の間隔で ※4 追加:1 回を初回接種終了後 60 日以上あけて (標準として 12～15 ヶ月齢時) ③初回接種開始時が 1 歳～2 歳未満の場合 60 日以上あけて 2 回 ④初回接種開始時が 2 歳～5 歳未満の場合 1 回 ※3: 初回接種の 2・3 回目は 2 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない (追加接種は可能)。また、初回接種の 2 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種の 3 回目は行わない (追加接種は可能)。 ※4: 初回接種の 2 回目は 2 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない (追加接種は可能)。				
B 型肝炎	1 歳未満 ※H28.4.1 生まれ以降	2 ヶ月～9 ヶ月	初回:2 回 追加:1 回	27 日以上 第 1 回目の注射から 139 日以上 (20～24 週) あけて
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	3 ヶ月～ 7 歳 6 ヶ月未満	初回: 3 ヶ月～ 1 歳未満 追加: 右記参照	3 回 1 回	20～56 日 (3～8 週) 初回接種終了後、1 年～1 年半あけて
麻しん 風しん	第 1 期: 1 歳～2 歳未満 第 2 期: 5 歳～7 歳未満 (小学校入学前年度の 1 年間)		1 回 1 回	
水痘	1 歳～3 歳未満	右記参照	2 回	1 歳～1 歳 3 ヶ月までに 1 回目、 1 回目から 6～12 ヶ月あけて 2 回目
日本脳炎	第 1 期: 6 ヶ月～ 7 歳 6 ヶ月未満 第 2 期: 9 歳～13 歳未満	初回: 3 歳以上 4 歳未満 追加: 4 歳以上 5 歳未満 9 歳以上 10 歳未満	2 回 1 回 1 回	6～28 日 初回接種終了後 6 ヶ月以上、概ね 1 年あけて

*これらの定期接種の他に、任意接種 (有料) でロタウイルス (生後 6 週～6～8 ヶ月までに 2～3 回。シロップ状の飲むワクチン。)、おたふくかぜ (1 歳～1 回目、5～6 歳で 2 回目。) もあります。



医療機関での予防接種の受け方について


下記の医療機関で接種をすることが出来ます。

事前に予約が必要なので、医療機関に直接お問い合わせください。

接種可能医療機関	ワクチン名							同時接種※1 について
	Hib	小児 肺炎 球菌	B型 肝炎	四種 混合	麻しん 風しん	水痘	日本 脳炎	
新冠町国保診療所 0146-47-2411	○	○	○	○	○	○	○	Hib・小児肺炎 球菌の同時接種 が可能
山田クリニック 0146-43-0008	○	○	○	○	○	○	○	
日高徳州会病院 0146-42-0701	○	○	○	○	○	○	○	ワクチンの種 類・数を問わず 同時接種が可能
駒木クリニック 0146-45-0123	○	○	○	×	×	×	○	×

※1：複数のワクチンを異なる部位（上腕、大腿等）に各々接種します。安全上の問題はないとされており、子ども本人や保護者の負担を軽減することができます。

異なる種類の予防接種を受ける場合の接種間隔について



予防接種を受けたら…

