



令和3年度版



予防接種の予定



《お問い合わせ》

新冠町役場 保健福祉課 保健福祉グループ
健康推進係 保健師






TEL: 0146-47-2113


□ 予防接種って？

赤ちゃんや子どもは、大人のように、病気に対する抵抗力が完全にできあがっていません。そのため感染症にかかると、大人では考えられないような重い症状になることがあります。

赤ちゃんや子どもが、病気にかからないために行うのが予防接種です。

□ 予防接種を受ける前に知っておきたいこと

- ①  前日は、入浴させ、身体を清潔にしておきましょう！
- ②  接種日の朝は、子どもの状態をよく観察し、体調に変化がないか確認しましょう！
- ③  体調が悪いかな？と思ったら、次の機会に受けるようにしましょう！
- ④  受ける予防接種の必要性や効果、副反応を確認してから行きましょう。母子手帳交付時にお渡ししている『予防接種と子どもの健康』という冊子をお読みください。
- ⑤  当日持参する予診票は、お子さまの大切な資料となります。しっかりと記入して持参しましょう。
- ⑥  母子手帳は予防接種の大事な記録帳でもあります。当日は忘れず持参しましょう。



定期の予防接種スケジュール



定期接種の種類

（定期接種： 法律によって種類と接種対象が定められているもの（無料））

予防接種の種類	対象者	標準的な接種期間※	回数	間隔
Hib (インフルエンザ菌b型)	2ヶ月～5歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が2ヶ月～7ヶ月の場合 初回:3回 追加:1回	27～56日(4～8週) ※1 初回接種終了後、7～13ヶ月あけて
～接種開始時期によって接種回数が違います～ ②初回接種開始時期が7ヶ月～12ヶ月の場合 初回:2回を27～56日(4～8週)間隔で※2 追加:1回を初回接種終了後、7～13ヶ月あけて ③初回接種開始時期が1歳～5歳未満の場合 1回 ※1: 初回の2・3回目は1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回行う。 ※2: 初回接種の2回目は1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27日以上の間隔をおいて1回行う。				

予防接種の種類		対象者	標準的な接種期間	回数	間隔
小児用 肺炎球菌		2 ヶ月～5 歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が 2 ヶ月～7 ヶ月の場合 初回:3 回 追加:1 回	27 日以上（4 週以上）※3 初回接種終了後 60 日以上あけて （標準として 12～15 ヶ月齢時）
				～接種開始時期によって接種回数違います～ ②初回接種開始時が 7 ヶ月～12 ヶ月の場合 初回:2 回を 27 日以上（4 週以上）の間隔で※4 追加:1 回を初回接種終了後 60 日以上あけて （標準として 12～15 ヶ月齢時） ③初回接種開始時が 1 歳～2 歳未満の場合 60 日以上あけて 2 回 ④初回接種開始時が 2 歳～5 歳未満の場合 1 回 ※3：初回接種の 2・3 回目は 2 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない（追加接種は可能）。 また、初回接種の 2 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種の 3 回目は行わない（追加接種は可能）。 ※4：初回接種の 2 回目は 2 歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない（追加接種は可能）。	
B 型肝炎		1 歳未満 ※H28.4.1 生まれ以降	2 ヶ月～9 ヶ月	初回:2 回	27 日以上
				追加:1 回	第 1 回目の注射から 139 日以上 （20～24 週）あけて
四種混合 （ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）		3 ヶ月～ 7 歳 6 ヶ月未満	初回：3 ヶ月～ 1 歳未満	3 回	20～56 日（3～8 週）
			追加：右記参照	1 回	初回接種終了後、1 年～1 年半あけて
二種混合 （ジフテリア・破傷風）		1 1 歳～ 1 3 歳未満	1 1 歳～1 2 歳	1 回	
BCG		1 歳未満	5 ヶ月～8 ヶ月	1 回	
麻しん 風しん		第 1 期：1 歳～2 歳未満		1 回	
		第 2 期：5 歳～7 歳未満 （小学校入学前年度の 1 年間）		1 回	
水痘		1 歳～3 歳未満	右記参照	2 回	1 歳～1 歳 3 ヶ月までに 1 回目、 1 回目から 6～12 ヶ月あけて 2 回目
日本脳炎		第 1 期： 6 ヶ月～ 7 歳 6 ヶ月未満	初回：3 歳以上 4 歳未満	2 回	6～28 日
			追加：4 歳以上 5 歳未満	1 回	初回接種終了後 6 ヶ月以上、概ね 1 年 あけて
		第 2 期： 9 歳～13 歳未満	9 歳以上 10 歳未満	1 回	
ロタ ウイルス ※	1 価 （ロタリックス）	生後 6 週から 生後 24 週まで	初回接種につい ては、 生後 2 ヶ月～ 14 週 6 日まで	2 回	27 日以上
	5 価 （ロタテック）	生後 6 週から 生後 32 週まで		3 回	27 日以上

※ロタウイルスは、R2.10.1～定期接種化。対象は R2.8.1 生まれ以降の者。

*任意接種（全額自費）：おたふくかぜ（1 歳～1 回目、5～6 歳で 2 回目）




医療機関での予防接種の受け方について

下記の医療機関で接種をすることが出来ます。事前に予約が必要なので、各医療機関にお問い合わせください。

接種可能医療機関	ワクチン名									同時接種※1 について
	H i b	小児 肺炎 球菌	B 型 肝 炎	四 種 混 合	麻しん 風しん	水 痘	日 本 脳 炎	ロタウ イルス		
								1 価	5 価	
新冠町国保診療所 0146-47-2411	○	○	○	○	○	○	○	○	×	Hib・小児肺炎球菌・ロタウ イルスの同時接種が可能
山田クリニック 0146-43-0008	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Hib・小児肺炎球菌の同時接 種が可能
日高徳州会病院 0146-42-0701	○	○	○	○	○	○	○	○	×	ワクチンの種類・数を問わず 同時接種が可能
駒木クリニック 0146-45-0123	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×

※1：複数のワクチンを異なる部位（上腕、大腿等）に各々接種します。安全上の問題はないとされており、子ども本人や保護者の負担を軽減することができます。

□ 異なる種類の予防接種を受ける場合の接種間隔について(R2.10.1～改訂)



□ 予防接種を受けたら...

