



令和7年度版

予防接種の予定

《お問い合わせ》

新冠町役場 保健福祉課 保健福祉グループ

健康推進係 保健師



TEL: 0146-47-2113

□ 予防接種って？

赤ちゃんや子どもは、大人のように、病気に対する抵抗力が完全にできあがっていません。そのため感染症にかかると、大人では考えられないような重い症状になることがあります。

赤ちゃんや子どもが、病気にかからないために行うのが予防接種です。

□ 予防接種を受ける前に知っておきたいこと



① 前日は、入浴させ、身体を清潔にしておきましょう！



② 接種日の朝は、子どもの状態をよく観察し、体調に変化がないか確認しましょう！



③ 体調が悪いかな？と思ったら、次の機会に受けるようにしましょう！

④


受ける予防接種の必要性や効果、副反応を確認してから行きましょう。母子手帳交付時にお渡ししている『予防接種と子どもの健康』という冊子をお読みください。

⑤

当日持参する予診票は、お子さまの大切な資料となります。しっかりと記入して持参しましょう。

⑥

母子手帳は予防接種の大事な記録張でもあります。当日は忘れず持参しましょう。



定期の予防接種スケジュール



定期接種の種類

（定期接種：法律によって種類と接種対象が定められているもの（無料））

予防接種の種類	対象者	標準的な接種期間※	回数	間隔
Hib (インフルエンザ菌 b 型)	2 ヶ月～5 歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が 2 ヶ月～7 ヶ月の場合 初回:3 回 追加:1 回	27～56 日 (4～8 週) ※1 初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて
～接種開始時期によって接種回数が変わります～ ②初回接種開始時が 7 ヶ月～12 ヶ月の場合 初回:2 回を 27～56 日 (4～8 週) 間隔で ※2 追加:1 回を初回接種終了後、7～13 ヶ月あけて ③初回接種開始時が 1 歳～5 歳未満の場合 1 回 ※1: 初回の 2・3 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを越えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて 1 回行う。 ※2: 初回接種の 2 回目は 1 歳未満までに行うこととし、それを越えた場合は行わない。この場合、追加接種は初回接種の最後の注射終了後、27 日以上の間隔をおいて 1 回行う。				

予防接種の種類		対象者	標準的な接種期間	回数	間隔
小児用 肺炎球菌		2ヶ月～5歳未満	右記①参照	①初回接種開始時期が2ヶ月～7ヶ月の場合	
				初回:3回 追加:1回	27日以上(4週以上)※3 初回接種終了後60日以上あけて (標準として12～15ヶ月齢時)
				～接種開始時期によって接種回数が違います～ ②初回接種開始時が7ヶ月～12ヶ月の場合 初回:2回を27日以上(4週以上)の間隔で※4 追加:1回を初回接種終了後60日以上あけて (標準として12～15ヶ月齢時) ③初回接種開始時が1歳～2歳未満の場合 60日以上あけて2回 ④初回接種開始時が2歳～5歳未満の場合 1回 ※3: 初回接種の2・3回目は2歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能)。 また、初回接種の2回目は1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種の3回目は行わ ない(追加接種は可能)。 ※4: 初回接種の2回目は2歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない(追加接種は可能)。	
B型肝炎		1歳未満	2ヶ月～9ヶ月	初回:2回 追加:1回	27日以上 第1回目の注射から139日以上 (20～24週)あけて
四種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ)		2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	初回: 2ヶ月～1歳未満 追加: 右記参照	3回 1回	20～56日(3～8週) 初回接種終了後、1年～1年半あけて
五種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ及びHib)		2ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	初回: 2ヶ月～7ヶ月未満 追加: 右記参照	初回:3回 追加:1回	20～56日(3～8週) 初回接種終了後、6～18ヶ月あけて
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		11歳～ 13歳未満	11歳～12歳	1回	
BCG		1歳未満	5ヶ月～8ヶ月	1回	
麻しん 風しん		第1期: 1歳～2歳未満 第2期: 5歳～7歳未満 (小学校入学前年度の1年間)		1回 1回	
水痘		1歳～3歳未満	右記参照	2回	1歳～1歳3ヶ月までに1回目、 1回目から6～12ヶ月あけて2回目
日本脳炎		第1期: 6ヶ月～ 7歳6ヶ月未満	初回: 3歳以上 4歳未満 追加: 4歳以上 5歳未満	2回 1回	6～28日 初回接種終了後6ヶ月以上、概ね1年 あけて
			第2期: 9歳～13歳未満	9歳以上 10歳未満	1回
		ロタ ウイルス	1価 (ロタリックス)	生後6週から 生後24週まで	初回接種について は、 生後2ヶ月～14 週6日まで
5価 (ロタテック)	生後6週から 生後32週まで			3回	27日以上

*任意接種(全額自費): おたふくかぜ(1歳～1回目、5～6歳で2回目)




医療機関での予防接種の受け方について

下記の医療機関で接種をすることが出来ます。事前に予約が必要なので、各医療機関にお問い合わせください。

接種可能医療機関	ワクチン名												同時接種※1 について
	ロタ ウイルス		H i b	小児 肺炎 球菌	B型 肝炎	四種 混合	五種 混合	BCG	麻しん 風しん	水 痘	日本 脳炎	二種 混合	
	1 価	5 価											
新冠町国保診療所 0146-47-2411	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Hib・小児肺炎球菌・ロタウイルスの同時接種が可能
新ひだか町立静内病院 0146-42-0181	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ワクチンの種類・数を問わず同時接種が可能
山田クリニック 0146-43-0008	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	Hib・小児肺炎球菌の同時接種が可能
日高徳州会病院 0146-42-0701	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ワクチンの種類・数を問わず同時接種が可能
駒木クリニック 0146-45-0123	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×
仲川内科胃腸科医院 0146-42-0345	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×

※1：複数のワクチンを異なる部位（上腕、大腿等）に各々接種します。安全上の問題はないとされており、子ども本人や保護者の負担を軽減することができます。

異なる種類の予防接種を受ける場合の接種間隔について



予防接種を受けたら...

